

Contact *Candida auris*



Mise à jour
28/10/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Pédiatrie

Prise en charge du patient contact

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Mesures Additionnelles Contact:



Transfert d'un établissement de soins de l'étranger (hors Suisse)



Soins reçus à l'étranger pendant les 12 derniers mois y compris la dialyse



Provenance d'un hôpital suisse avec des cas



Contact avec un cas confirmé.



si date du contact avec le patient colonisé avec du *C. auris* remonte à
< de 3 mois



Précautions Standard



si date du contact avec le patient colonisé avec du *C. auris* remonte à > de
3 mois

Placement



Chambre individuelle



Cohortage possible avec un autre contact Candida Auris du même cas index (chambre à 2 lits maximum)

Durée des mesures



Mesures Additionnelles Contact durant les 3 premiers mois après le dernier contact avec patient positif dans l'attente des 2 dépistages négatifs



Précautions standard si la date du dernier contact remonte à plus de 3 mois

Signalétique

Si Mesures Additionnelles Contact :



Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)



Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS



Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique



Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles

Suivi microbiologique



Contrôle de la colonisation (portage) en accord avec le service HPCI



Deux dépistages négatifs avec un intervalle de 7 jours sont nécessaires pour considérer le patient plus à risque de transmission



Sites de prélèvement



frottis nez, les deux aisselles et les deux plis de l'aîne



et autre site (plaie)



et culture d'urine si présence de sonde vésicale

Matériel de soins



Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique.



Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)

Transport

Si Mesures Additionnelles Contact :



Literie et chemise du patient propres



Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates



Limiter les déplacements aux besoins essentiels



Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles



Désinfection du lit

Visiteurs

Si Mesures Additionnelles Contact :



Ne pas s'asseoir sur le lit



Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre

Transfert/Sortie

Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Mesures en cas d'épidémie



Se référer aux recommandations de l'unité HPCi

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Si Mesures Additionnelles Contact:
 - contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 - pas nécessaire si simple passage dans la chambre
 - Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
-

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 - Vaisselle : filière habituelle
 - Privilégier le matériel à usage unique
-

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
