

# Amibiase hépatique - CHUV



Mise à jour  
06/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

### Agents infectieux



*Entamoeba histolytica*



De 2 à 4 semaines. Dans les cas extrêmes: quelques jours ou plusieurs mois

---

### Réservoir



Homme



En cas de drainage, jusqu'à 48 heures après le début du traitement

---

### Mode de transmission



Par l'eau ou les denrées alimentaires, rarement par contact avec du pus ou du matériel contaminé

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

### Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

### Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  -  Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

## Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  -  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---