

Amibiase hépatique - CHUV



Mise à jour
06/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agents infectieux



Entamoeba histolytica



De 2 à 4 semaines. Dans les cas extrêmes: quelques jours ou plusieurs mois

Réservoir



Homme



En cas de drainage, jusqu'à 48 heures après le début du traitement

Mode de transmission



Par l'eau ou les denrées alimentaires, rarement par contact avec du pus ou du matériel contaminé

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
 -  Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
