

# Anthrax cutané - CHUV



Informations relatives à  
CHUV / Soins intensifs

## Epidémiologie

### Agents infectieux



*Bacillus anthracis*

---

### Réservoir



Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)

---

### Mode de transmission



Dans la communauté: par contact cutané direct avec des animaux malades ou des produits d'animaux contaminés, viande contaminée



A l'hôpital: possible dans de rares cas par contact direct avec des lésions cutanées

---

## Période d'incubation



1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours

---

## Prise en charge du patient

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante



Mesures Additionnelles Contact en présence de lésions cutanées avec écoulement non contenu par un pansement

---

## Placement

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Chambre individuelle



Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

---

## Durée des mesures



Jusqu'à l'arrêt de l'écoulement non contenu par un pansement

---

# Signalétique

## Si Mesures Additionnelles Contact :

-  Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
  -  Chariot d'isolement avec surblouses devant la chambre
  -  Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
  -  Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
  -  Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
- 

# Suivi microbiologique

-  Pas nécessaire de faire un prélèvement de suivi sauf avis contraire HPCi
- 

# Soins de base

-  En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier
- 

# Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés, désinfection des mains



Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur



Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit



Désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre



Limitier les déplacements aux besoins essentiels

---

## Circulation

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur



Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains



Le fauteuil du patient ou tout autre dispositif est désinfecté au moyen d'une lingette imprégnée d'alcool ou de détergent/désinfectant avant la sortie de la chambre



Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient



Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

---

## Visiteurs

### Si Mesures Additionnelles Contact :

-  Ne pas s'asseoir sur le lit
  -  Désinfection des mains en sortant de la chambre
  -  Surblouse seulement si participation aux soins
- 

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles :

-  Avertir le service/l'établissement de soins de destination
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

-  Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

## Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

## Blouse de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
  -  Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)
- 

## Masque

-  Non en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)
- 

## Lunettes de protection

-  Non en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)
- 

## Mesures complémentaires

-  En cas de contact direct avec les lésions cutanées, s'adresser à la médecine du personnel
-