HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Anthrax pulmonaire - CHUV

PS

Informations relatives à
CHUV / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Bacillus anthracis*

Réservoir

- Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)

Mode de transmission

- Par inhalation de spores lors de manipulation de tissus animaux contaminés dans des locaux mal ventilés
- Laboratoire: par inhalation de spores

- Acte de bioterrorisme: par inhalation de spores (nécessité de mesures de décontamination)

Période d'incubation

- 1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours

Prise en charge du patient

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- Déclaration initiale du médecin par téléphone dans les 2 heures