

Anthrax pulmonaire - CHUV



Informations relatives à
CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux



Bacillus anthracis

Réservoir



Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)

Mode de transmission



Par inhalation de spores lors de manipulation de tissus animaux contaminés dans des locaux mal ventilés



Laboratoire: par inhalation de spores



Acte de bioterrorisme: par inhalation de spores (nécessité de mesures de décontamination)

Période d'incubation



1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours

Prise en charge du patient

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

-  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

-  Déclaration initiale du médecin par téléphone dans les 2 heures
-