

Fièvre jaune - CHUV



Informations relatives à
CHUV / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

-  Arbovirus (Flavivirus)
 -  Zones urbaines: homme, moustiques (*Aedes aegyptii*, *Aedes spp*)
 -  Forêts: primates, marsupiaux, moustiques (*Aedes aegyptii*, *Aedes spp*)
-

Mode de transmission

-  Par les moustiques du genre *Aedes*
-

Période d'incubation



3 à 6 jours

Mesures de protection du personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masques



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soin

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans les 24h
