HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Fièvre jaune - CHUV

PS

Informations relatives à
CHUV / Psychiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux

- Arbovirus (Flavivirus)
- Zones urbaines: homme, moustiques (*Aedes aegyptii, Aedes spp*)
- Forêts: primates, marsupiaux, moustiques (*Aedes aegyptii, Aedes spp*)

Mode de transmission

- Par les moustiques du genre Aedes

Période d'incubation

- 3 à 6 jours

Mesures de protection du personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masques

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soin

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- Déclaration du médecin dans les 24h