HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Aspergillus (aspergillose)

PS

Mise à jour
28/10/2026

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger

Réservoir

Ubiquitaire dans la nature (sol, végétation en voie de putréfaction)

Mode de transmission

Par inhalation de spores présentes dans l'air, la poussière, le sol ou les matières en décomposition

Période d'incubation

- Probablement entre 2 jours et 3 mois

Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L’application des Précautions Standard est suffisante

Autre

Prévention chez les patients immunocompromis (agranulocytose > 10 jours) :

- Chambre avec ventilation en pression positive et filtre ultrafiltrant
- Les déplacements hors chambre des patients immunocompromis doivent être réduits au minimum et le patient doit porter un masque FFP2
- Lors de travaux dans l'enceinte de l'hôpital, prendre les précautions indiquées par l'unité HPCi pour éviter la propagation de poussières dans les unités d'hospitalisation
- CF : guide de bonnes pratiques de prévention et de gestion du risque infectieux lors de travaux

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles