

Aspergillus (aspergillose)



Mise à jour
09/10/2024

Informations relatives à
CHUV / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

Aspergillus fumigatus, *A. flavus*, *A. niger*

Réservoir

Ubiquitaire dans la nature (sol, végétation en voie de putréfaction)

Mode de transmission

Inhalation de poussières contenant des spores, surtout en relation avec des travaux ou contamination importante de l'environnement (ventilation)

Période d'incubation

Probablement entre 2 jours et 3 mois

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Autre

Prévention chez les patients immunocompromis (agranulocytose > 10 jours):



Chambre avec ventilation en pression positive et filtre ultrafiltrant



Les déplacements hors chambre des patients immunocompromis doivent être réduits au minimum et le patient doit porter un masque FFP2



Lors de travaux dans l'enceinte de l'hôpital, prendre les précautions indiquées par l'unité HPCi pour éviter la propagation de poussières dans les unités d'hospitalisation

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
