HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Blastomycose

PS

Mise à jour
26/10/2026

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Blastomyces dermatitis* (champignon dimorphique)

### Réservoir

- Le sol humide

### Mode de transmission

- Dans la communauté: inhalation de poussières
- A l'hôpital: pas de transmission connue

## Période d'incubation

Inconnue, probablement de plusieurs semaines à plusieurs mois

## Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L’application des Précautions Standard est suffisante

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

## Gants

Non indiqué en systématique

- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

## Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

## Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

## Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles