

# Blastomycose



Mise à jour  
06/11/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Blastomyces dermatitis* (champignon dimorphique)

---

## Réservoir

Le sol humide

---

## Mode de transmission



dans la communauté: inhalation de poussières



à l'hôpital: pas de transmission connue

---

## Période d'incubation

Inconnue, probablement de plusieurs semaines à plusieurs mois

---

## Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants

Non indiqués en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque  
Vaisselle : filière habituelle

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

---

# Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

# Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---