

# Infections respiratoires virales chez l'adulte



Mise à jour  
12/11/2024

## Autres dénominations

Adénovirus

COVID-19 - VAUD

Coronavirus Saisonniers (Coronavirus Autre Que SARS-CoV-1-2 Et MERS)

Grippe Saisonnière (Influenza)

Human Metapneumovirus

Influenza Virus

Parainfluenza Virus

Rhinovirus

RSV

Virus Syncytial Respiratoire

## Informations relatives à

Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Adénovirus, Coronavirus (non SARS, non MERS), Human Metapneumovirus, Parainfluenza, Rhinovirus, Virus respiratoire syncytial (RSV), Influenza (grippe saisonnière), COVID-19 (SARS-CoV-2)

---

# Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  Principalement par gouttelettes ou contact direct
  -  Transmission par aérosol possible dans des situations spéciales :
    -  Soins rapprochés à la sphère ORL du patient (rayon de < 1m) notamment si soin prolongé/répétitif (> 15 min cumulés) ou
    -  Gestes générant des aérosols
- 

## Période d'incubation

12 heures à 5 jours (selon l'agent)

---

## Durée d'infectiosité

En général de 1 jour avant à 5 jours après le début des symptômes. Infectiosité prolongée chez les patients immunosupprimés

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

## Placement

-  Mise à l'écart dans l'attente de la consultation
  -  Si passage en salle d'attente
  -  faire porter un masque au patient (si possible)
- 

## Durée des mesures

-  **Au minimum 5 jours** depuis le début des symptômes ou le premier test positif (si pas de symptômes)
  -  **Et** absence de fièvre depuis minimum 24h
  -  **Et** amélioration clinique des autres symptômes
- 

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

## Transport

- > Port d'un masque de soins par le patient si transfert en milieu de soins
- > Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Gants

- > Non indiqués en systématique
- > A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

- > Masque de soins type II/IIR
- > Masque FFP2 si :
  - > Soins rapprochés à la sphère ORL du patient (rayon de < 1m) notamment si soin prolongé/répétitif (> 15 min cumulés) ou



Gestes générant des aérosols

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Reservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Privilégier le matériel à usage unique

---

### Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

### Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

### Autre information

### À consulter

Voir la recommandation des virus respiratoires

---

# Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Oui dans tous les cas

---

## Déclaration au médecin cantonal

Les flambées de cas (>2cas) doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 1 jour

---