

# Candidose



Mise à jour  
06/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Candida albicans*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



par contact avec des sécrétions de personnes symptomatiques ou porteuses  
(bouche, peau, vagin, selles, relations sexuelles)



transmission mère-enfant lors d'accouchement par voie basse

 par dissémination endogène

---

## Période d'incubation

Variable

---

## Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que des lésions sont présentes

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

 Aucune, application des Précautions Standard

---

## Mesures de protections/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

 Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

## Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

## Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

## Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---