HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Candidose

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Candida Albicans

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Candida* sp
- A l'exception du *Candida auris*

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Par contact avec des sécrétions de personnes symptomatiques ou porteuses (bouche, peau, vagin, selles, relations sexuelles)
- Transmission mère-enfant lors d'accouchement par voie basse

- Par dissémination endogène

Période d'incubation

- Variable

Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps que des lésions sont présentes

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Pour la prise en charge du *Candida auris*, se référer à la fiche *Candida auris*
- L’application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protections/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles