

Candidose



Mise à jour
06/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Psychiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux

Candida albicans

Réservoir

Homme

Mode de transmission



par contact avec des sécrétions de personnes symptomatiques ou porteuses
(bouche, peau, vagin, selles, relations sexuelles)



transmission mère-enfant lors d'accouchement par voie basse

 par dissémination endogène

Période d'incubation

Variable

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que des lésions sont présentes

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

 Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protections/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

 Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
