HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Chancre mou (Chancroide)

PS

Mise à jour
28/10/2026

Autres dénominations
Haemophilus Ducreyi

Informations relatives à
CHUV / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

Haemophilus ducreyi

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Par relations sexuelles avec des personnes infectées

Période d'incubation

Le plus souvent 3 à 5 jours, jusqu'à 14 jours

Durée d'infectiosité

Jusqu'à guérison des ulcères

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles