HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Conjonctivite à Chlamydia

PS

Mise à jour
28/10/2026

Autres dénominations
Chlamydia Trachomatis

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Chlamydia trachomatis*

### Réservoir

Homme

### Mode de transmission

Dans la communauté: transmission verticale (mère-enfant), sécrétions génitales c/o adulte

- A l'hôpital: transmission directe par contact ou par l'intermédiaire d'instruments ophtalmiques insuffisament décontaminés

## Période d'incubation

- Chez le nouveau-né: 5 à 14 jours
- Chez l'adulte: 6 à 19 jours

## Durée d'infectiosité

- Durée de l'écoulement

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

## Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles