HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Conjonctivite à Chlamydia

PS

Mise à jour
28/10/2026

Autres dénominations
Chlamydia Trachomatis

Informations relatives à
CHUV / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

Chlamydia trachomatis

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Dans la communauté: transmission verticale (mère-enfant), sécrétions génitales c/o adulte

- A l'hôpital: transmission directe par contact ou par l'intermédiaire d'instruments ophtalmiques insuffisament décontaminés

Période d'incubation

- Chez le nouveau-né: 5 à 14 jours
- Chez l'adulte: 6 à 19 jours

Durée d'infectiosité

- Durée de l'écoulement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles