

Infections transmises par les moustiques



Mise à jour
25/07/2024

Autres dénominations

Fièvre Dengue

Chikungunya

Fièvre Jaune

Paludisme

Zika

Fièvre Du Nil Occidentale

Malaria

Encéphalite Japonaise

Informations relatives à
CMS et soignants indépendants

Epidémiologie

Agent infectieux



Dengue



Malaria (paludisme): *Plasmodium falciparum*, *P.vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. knowlesi*



Fièvre du Nile Occidental



Chikunguya



Fièvre jaune, Zika, encéphalite japonaise

Réservoir

- > Homme infecté
 - > Mamifères / oiseaux
 - > Moustique
-

Mode de transmission

Par la piqûre des femelles infectées de moustiques, principalement de l'espèce *Aedes aegypti*, mais aussi dans une moindre mesure d' *Aedes albopictus* (*tigre*)

Période d'incubation

3 à 14 jours, le plus souvent 4 à 10 jours

Pour la malaria (paludisme):

- > *P. falciparum*: 9 à 14 jours
 - > *P. vivax* et *P. ovale*: 12 et 18 jours, parfois plusieurs mois (*P. vivax*)
 - > *P. malariae*: 18 à 40 jours
-

Durée d'infectiosité

- > Pas de transmission interhumaine
- > Pour le virus Zika: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie verticale, sexuelle et sanguine et par transplantation d'organes



Pour la fièvre jaune: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie sanguine jusqu'à 7 jours après l'infection



Le plasmodium peut être transmis par transfusion ou par des aiguilles souillées (anecdotique)

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante



La présence d'une moustiquaire est recommandée

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

 Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

 Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie

 Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal/OFSP

Déclaration au médecin cantonal dans les 24 heures



Arbovirus - Flavivirus - Fièvre Dengue



Chikungunya



Fièvre Jaune



Zika



Fièvre Du Nil Occidentale



Encéphalite Japonaise

Déclaration au médecin cantonal dans les 7 jours



Paludisme - Malaria
