

# Infections transmises par les moustiques



Mise à jour  
25/07/2024

Autres dénominations

Fièvre Dengue

Chikungunya

Fièvre Jaune

Paludisme

Zika

Fièvre Du Nil Occidentale

Malaria

Encéphalite Japonaise

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Toutes spécialités

## Epidémiologie

## Agent infectieux



Dengue



Malaria (paludisme): *Plasmodium falciparum*, *P.vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. knowlesi*



Fièvre du Nile Occidental



Chikunguya



Fièvre jaune, Zika, encéphalite japonaise

---

## Réservoir

-  Homme infecté
  -  Mamifères / oiseaux
  -  Moustique
- 

## Mode de transmission

Par la piqûre des femelles infectées de moustiques, principalement de l'espèce *Aedes aegypti*, mais aussi dans une moindre mesure d' *Aedes albopictus* (*tigre*)

---

## Période d'incubation

3 à 14 jours, le plus souvent 4 à 10 jours

Pour la malaria (paludisme):

-  *P. falciparum*: 9 à 14 jours
  -  *P. vivax* et *P. ovale*: 12 et 18 jours, parfois plusieurs mois (*P. vivax*)
  -  *P. malariae*: 18 à 40 jours
- 

## Durée d'infectiosité

-  Pas de transmission interhumaine
-  Pour le virus Zika: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie verticale, sexuelle et sanguine et par transplantation d'organes

-  Pour la fièvre jaune: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie sanguine jusqu'à 7 jours après l'infection
-  Le plasmodium peut être transmis par transfusion ou par des aiguilles souillées (anecdotique)

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions Standard est suffisante
-  La présence d'une moustiquaire est recommandée

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

 Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

 Vaisselle : filière habituelle

---

### Lit et literie

 Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

---

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au médecin cantonal/OFSP

Déclaration au médecin cantonal dans les 24 heures



Arbovirus - Flavivirus - Fièvre Dengue



Chikungunya



Fièvre Jaune



Zika



Fièvre Du Nil Occidentale



Encéphalite Japonaise

Déclaration au médecin cantonal dans les 7 jours



Paludisme - Malaria

---