Infections transmises par les moustiques

PS

Mise à jour
25/07/2024

Autres dénominations
Fièvre Dengue
Chikungunya
Fièvre Jaune
Paludisme
Zika
Fièvre Du Nil Occidentale
Malaria
Encéphalite Japonaise

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

- Dengue
- Malaria (paludisme)*: Plasmodium falciparum, P.vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi*
- Fièvre du Nile Occidental
- Chikunguya
- Fièvre jaune, Zika, encéphalite japonaise

Réservoir

- Homme infecté
- Mamifères / oiseaux
- Moustique

Mode de transmission

Par la piqûre des femelles infectées de moustiques, principalement de l'espèce *Aedes aegypti*, mais aussi dans une moindre mesure d' *Aedes albopictus (tigre)*

Période d'incubation

3 à 14 jours, le plus souvent 4 à 10 jours

Pour la malaria (paludisme):

- *P. falciparum*: 9 à 14 jours
- *P. vivax* et *P. ovale*: 12 et 18 jours, parfois plusieurs mois (*P. vivax*)
- *P. malariae*: 18 à 40 jours

Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine
- Pour le virus Zika: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie verticale, sexuelle et sanguine et par transplantation d'organes

- Pour la fièvre jaune: dès qu'infection peut avoir une transmission par voie sanguine jusqu'à 7 jours après l'infection
- Le plasmodium peut être transmis par transfusion ou par des aiguilles souillées (anecdotique)

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante
- La présence d'une moustiquaire est recommandée

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

- Non indiqués en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

- Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal/OFSP

Déclaration au médecin cantonal dans les 24 heures

- Arbovirus - Flavivirus - Fièvre Dengue
- Chikungunya
- Fièvre Jaune
- Zika
- Fièvre Du Nil Occidentale
- Encéphalite Japonaise

Déclaration au médecin cantonal dans les 7 jours

- Paludisme - Malaria