

Dermatomycose ou teigne

Mise à jour
08/11/2024Autres dénominations
TeigneInformations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Trichophyton, Microsporum et Epidermophyton

Réservoir

Homme, animaux (chats et chiens)

Mode de transmission



dans la communauté: contact direct / indirect avec des personnes ou des animaux infectés



à l'hôpital: contact direct ou par l'intermédiaire d'objets (peigne, brosse) ainsi que par la contamination des sols de douche ou de piscine



Période d'incubation

10 à 14 jours

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que les dermatophytes peuvent être mis en évidence dans les lésions

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

Non indiqués en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Lit et literie

Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

Utiliser les sacs à linge usuels

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
