HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Dermatomycose ou teigne

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Teigne

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Trichophyton*, *Microsporum* et *Epidermophyton*

Réservoir

- Homme, animaux (chats et chiens)

Mode de transmission

- Dans la communauté: contact direct / indirect avec des personnes ou des animaux infectés
- A l'hôpital: contact direct ou par l'intermédiaire d'objets (peigne, brosse) ainsi que par la contamination des sols de douche ou de piscine

- Matériel infectieux: lésions cutanées, cheveux, squames cutanées

Période d'incubation

- 10 à 14 jours

Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps que les dermatophytes peuvent être mis en évidence dans les lésions

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

Soins de base

- Ne pas partager les affaires personnelles (brosse, peignes, chapeaux)
- Utilisation de la douche en dernier si partagées avec d'autres patients et désinfection

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles