HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Diarrhée sur intoxication alimentaire

PS

Mise à jour
30/10/2026

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus cereus*

### Réservoir

- *S. aureus*: homme
- *C. perfringens*: sol, homme, animaux
- *B. cereus*: ubiquitaire

### Mode de transmission

- *S. aureus*: mains, nez, denrées alimentaires contaminés par les toxines (lait, plats aux oeufs, crèmes, pâtisseries, salades et sandwiches)

- *C. perfringens*: viande ou dérivés (vol-au-vent, volailles) contaminés par les toxines

## Période d'incubation

- *S. aureus*: 1 à 6 heures
- *C. perfringens*: 8 à 16 heures
- *B. cereus* : 10-16 heures

## Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

## Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

## Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

## Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

## Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

## Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x/j
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

## Déclaration du cas

# Déclaration au médecin cantonal

- En cas de flambée de cas, utiliser le formulaire : **flambée de cas** - Site OFSP
  - A envoyer dans un délai de 24h au médecin cantonal