

Herpès simplex virus (HSV)

Mise à jour
12/11/2024Autres dénominations
Méningo-Encéphalite HerpétiqueInformations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus Herpes simplex de type 1 ou 2

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Dans la communauté:

HSV-1, principalement par la salive

HSV-2, principalement par voie sexuelle, risque d'infection néonatale si la mère présente une infection au niveau génital (réactivation)

Transmission par voie sexuelle



Rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux avec une personne atteinte d'herpès génital

-  Contact oral-génital ou génital-buccal (par exemple, en pratiquant ou en recevant des rapports sexuels oraux)
 -  Contact peau à peau avec la zone infectée, même sans pénétration
 -  Partage de jouets sexuels avec une personne infectée
 - Transmission non sexuelle
 -  Embrasser une personne atteinte d'herpès buccal (boutons de fièvre)
 -  Contact avec la peau près de la bouche d'une personne atteinte d'herpès buccal
 -  Partage d'objets ayant touché la salive d'une personne infectée (verres à boire, ustensiles de cuisine, rouge à lèvres)
 -  Transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement
-

Période d'incubation

2 à 12 jours

Durée d'infectiosité

Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection et 4 à 7 jours en cas de réactivation

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Matériel de soin

-  Réserve au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
-  Privilégier le matériel à usage unique.
-  Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

-  Non indiqués en systématique
 -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  À la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
-

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - Si Mesures Additionnelles:
 - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
 - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
 - Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
 - Si paravent: nettoyage au quotidien
-

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
