

# Herpès simplex virus (HSV)

Mise à jour  
12/11/2024Autres dénominations  
Méningo-Encéphalite HerpétiqueInformations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus Herpes simplex de type 1 ou 2

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Dans la communauté:

HSV-1, principalement par la salive

HSV-2, principalement par voie sexuelle, risque d'infection néonatale si la mère présente une infection au niveau génital (réactivation)

Transmission par voie sexuelle



Rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux avec une personne atteinte d'herpès génital

 Contact oral-génital ou génital-buccal (par exemple, en pratiquant ou en recevant des rapports sexuels oraux)

 Contact peau à peau avec la zone infectée, même sans pénétration

 Partage de jouets sexuels avec une personne infectée

Transmission non sexuelle

 Embrasser une personne atteinte d'herpès buccal (boutons de fièvre)

 Contact avec la peau près de la bouche d'une personne atteinte d'herpès buccal

 Partage d'objets ayant touché la salive d'une personne infectée (verres à boire, ustensiles de cuisine, rouge à lèvres)

 Transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement

---

## Période d'incubation

2 à 12 jours

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection et 4 à 7 jours en cas de réactivation

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

 L'application des Précautions Standard est suffisante



Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT si lésions disséminées

---

## Placement



Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT



En absence de chambre individuelle disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique

---

## Signalétique



Si Mesures Additionnelles



Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)



Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS



Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique



Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles

---

## Matériel de soin



Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique.



Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturemètre, etc)

---

## Transport

- Literie et chemise du patient propres
  - Si Mesures Additionnelles:
    - Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
    - Limiter les déplacements aux besoins essentiels
    - Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
    - Désinfection du lit
- 

## Visiteurs

### **Si Mesures Additionnelles Contact :**

- Ne pas s'asseoir sur le lit
- Désinfection des mains en sortant de la chambre
- Surblouse seulement si participation aux soins

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  -  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Si Mesures Additionnelles:
    -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
    -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
    -  Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
  -  Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Oui, si Mesures Additionnelles (Herpès disséminé)

---