HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Entérocolite à Clostridioides difficile

Mise à jour
08/11/2024

Autres dénominations
Clostridioides Difficile
Colite Pseudo-Membraneuse

Informations relatives à
EMS, EPSM, ESE, CAT

Epidémiologie

Agent infectieux

Clostridioides difficile (anciennement *Clostridium difficile)* toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)

Réservoir

Homme, environnement

Mode de transmission

- par l'intermédiaire des mains
- par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores

- par l'environnement contaminé par les spores

Période d'incubation

Variable, 1 jour à 6 semaines

Durée d'infectiosité

Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT + GANTS

Placement

- Chambre individuelle avec sanitaires dédiés ou, à défaut, un dispositif médical pour le recueil des excreta (chaise percée) dedié au patient

Durée des mesures

- Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes

- Pour les patients immunosupprimés
  - maintenir les Mesures Additionnelles 48h après la fin du traitement de l'entérocolite

Signalétique

- Affiche sur la porte à l’extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
- Blouses /**gants** devant la chambre

Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
- Privilégier le matériel à usage unique (UU)
- Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement

Transport

- Literie et vêtements du résident propres
- Désinfection du lit
- Lors d’un transfert en cabinet médical ou à l’hôpital:
  - Avertir le service/établissement de soins de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Circulation

- Maintien en chambre
- Eviter toute activité collective

Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
- Lavage des mains en sortant de la chambre
- port d'une surblouse

Autre

- **Gants non stériles** pour tout contact avec le résident ou son environnement immédiat
- Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
- Utilisation de sanitaires dédiés ou, à défaut, un dispositif médical pour le recueil des excreta (chaise percée) dedié
- Demander au résident de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- **Le lavage des mains à l'eau et au savon doux** est la seule méthode efficace pour éliminer les spores de *C. difficile* (par l'action mécanique du frottement des mains)
- Les produits hydroalcooliques (PHA) sont inefficaces contre les spores

Gants

- **Gants non stériles** pour contact avec le patient ou son environnement immédiat
- Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin

Blouse de protection

- Oui, si contact direct avec le résident (en particulier lors de la toilette) ou son environnement immédiat
- Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
- Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
  - Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
  - Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
  - Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct y compris les sols des sanitaires
- **En cas d'épidémie, ou à la levée des Mesures Additionnelles :**
  - Utiliser un détergent/ désinfectant spécifique aux spores , Clostridioides difficile (Après une détersion minutieuse (détergent) **une solution d'eau de Javel** (hypochlorite de Na) **à une concentration de 0.5% peut être utilisé)**

- Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
  - Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
  - Tout le matériel désinfectable présent en chambre est désinfecté ou retraité
  - Changement du rideau de séparation

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration à HPCi Vaud

Si flambée de cas (> 1 cas durant la même semaine)