

# Entérococolite à Clostridioides difficile



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations

Clostridioides Difficile

Colite Pseudo-Membraneuse

Informations relatives à  
CMS et soignants indépendants

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Clostridioides difficile* (anciennement *Clostridium difficile*) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)

---

## Réservoir

Homme, environnement

---

## Mode de transmission



par l'intermédiaire des mains



par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores



par l'environnement contaminé par les spores

---

## Période d'incubation

Variable, 1 jour à 6 semaines

---

## Durée d'infectiosité

Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT + GANTS

---

## Durée des mesures



Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes



Pour les patients immunosupprimés



maintenir les Mesures Additionnelles 48h après la fin du traitement de l'entérocolite

---

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

## Autre

Lors des soins, **gants non stériles** pour tout contact avec le patient  
Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin  
Insister auprès du patient sur l'importance du lavage des mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

-  **Le lavage des mains à l'eau et au savon doux** est la seule méthode efficace pour éliminer les spores de *C. difficile* (par l'action mécanique du frottement des mains)
  -  Les produits hydroalcooliques (PHA) sont inefficaces contre les spores
- 

## Gants

-  **Gants non stériles** pour contact avec le patient ou son environnement immédiat



Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin

---

## Blouse de protection



Oui, à domicile lors de tout soin avec contact corporel étroit ceci jusqu'à 48 après la fin des diarrhées



Pas nécessaire si simple passage dans la chambre



Pas nécessaire en consultation ambulatoire

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).



Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :



Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté

-  Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
  -  Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés
- 

## Environnement

-  Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
  -  Après la consultation
    -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table d'examen, chariot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.)
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---