

# Entérocologie à Clostridioides difficile



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations

Clostridioides Difficile

Colite Pseudo-Membraneuse

Informations relatives à  
Ambulances et transporteurs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Clostridioides difficile* (anciennement *Clostridium difficile*) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)

---

## Réservoir

Homme, environnement

---

## Mode de transmission



par l'intermédiaire des mains



par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores



par l'environnement contaminé par les spores

---

## Période d'incubation

Variable, 1 jour à 6 semaines

---

## Durée d'infectiosité

Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT + GANTS

---

## Autre

Lors des soins, **gants non stériles** pour tout contact avec le patient  
Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin  
Insister auprès du patient sur l'importance du lavage des mains avant chaque repas  
et après avoir été aux toilettes

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

-  **Le lavage des mains à l'eau et au savon doux** est la seule méthode efficace pour éliminer les spores de *C. difficile* (par l'action mécanique du frottement des mains)
  -  Les produits hydroalcooliques (PHA) sont inefficaces contre les spores
- 

## Gants

-  **Gants non stériles** pour contact avec le patient ou son environnement immédiat
  -  Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
- 

## Blouse de protection

-  Oui, à domicile lors de tout soin avec contact corporel étroit ceci jusqu'à 48 après la fin des diarrhées
  -  Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
  -  Pas nécessaire en consultation ambulatoire
- 

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
  -  Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
    -  Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
    -  Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
    -  Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés
- 

### Environnement

-  Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
  -  Après la consultation
    -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table d'examen, chariot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.)
- 

### Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---