

Entérocolite à Clostridioïdes difficile



Mise à jour
08/11/2024

Autres dénominations
Clostridioïdes Difficile
Colite Pseudo-Membraneuse

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

Clostridioïdes difficile (anciennement *Clostridium difficile*) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)

Réservoir

Homme, environnement

Mode de transmission

- par l'intermédiaire des mains
- par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores



par l'environnement contaminé par les spores

Période d'incubation

Variable, 1 jour à 6 semaines

Durée d'infectiosité

Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT + GANTS

Autre

Lors des soins, **gants non stériles** pour tout contact avec le patient
Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Insister auprès du patient sur l'importance du lavage des mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- **Le lavage des mains à l'eau et au savon doux** est la seule méthode efficace pour éliminer les spores de *C. difficile* (par l'action mécanique du frottement des mains)
 - Les produits hydroalcooliques (PHA) sont inefficaces contre les spores
-

Blouse de protection

- Oui, à domicile lors de tout soin avec contact corporel étroit ceci jusqu'à 48 après la fin des diarrhées
 - Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
 - Pas nécessaire en consultation ambulatoire
-

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
 - Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
 - Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
 - Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
 - Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés
-

Environnement

- Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).
 - Après la consultation
 - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table d'examen, chariot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.)
-

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
