

Entérococolite à Clostridioides difficile



Mise à jour
08/11/2024

Autres dénominations

Clostridioides Difficile

Colite Pseudo-Membraneuse

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Clostridioides difficile (anciennement *Clostridium difficile*) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)

Réservoir

Homme, environnement

Mode de transmission



par l'intermédiaire des mains



par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores



par l'environnement contaminé par les spores

Période d'incubation

Variable, 1 jour à 6 semaines

Durée d'infectiosité

Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT + GANTS

Durée des mesures



Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes



Pour les patients immunosupprimés



maintenir les Mesures Additionnelles 48h après la fin du traitement de l'entérocolite

Matériel de soins

- > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - > Privilégier le matériel à usage unique (UU)
 - > Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

Autre

Lors des soins, **gants non stériles** pour tout contact avec le patient
Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Insister auprès du patient sur l'importance du lavage des mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

- > **Gants non stériles** pour contact avec le patient ou son environnement immédiat
 - > Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
-

Blouse de protection

- > Oui, à domicile lors de tout soin avec contact corporel étroit ceci jusqu'à 48 après la fin des diarrhées
- > Pas nécessaire si simple passage dans la chambre



Pas nécessaire en consultation ambulatoire

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).



Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :



Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté



Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter



Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés

Environnement



Utiliser un désinfectant ayant une activité prouvée contre C. difficile/une activité sporicide (suivre les instructions du fabricant).



Après la consultation



Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table d'examen, chariot de soins, stéthoscope, brassard à pression, etc.)

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
