

# Entérocoque résistant à la vancomycine

Mise à jour  
08/11/2024Autres dénominations  
VRE/ERG/ERVInformations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Médical

Résolu

Epidémie de VRE en cours à l'Hôpital de Morges (EHC), CTR d'Aubonne et de Gilly  
Déclenchée le 17/01/2025

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Enterococcus faecium* ou *faecalis* résistant à la vancomycine *vanA* ou *vanB*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  par contact direct entre patients
  -  par l'intermédiaire du personnel (mains)
  -  par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
- 

## Période d'incubation

Variable

---

## Durée d'infectiosité

Durée du portage (très variable: quelques semaines à plusieurs mois). Peut être prolongée chez un patient immunocompromis

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Suivi microbiologique

Contrôle de la colonisation (portage):

Si portage du VRE remonte à plus de 6 mois( = dernier prélèvement positif) faire un contrôle du portage, en accord avec l'unité cantonale HPCI

-  frottis rectal (avec matière fécale visible), culture d'urine si sonde et autre site colonisé
  -  si résultat du 1er frottis négatif, faire un 2ème frottis à J 7
  -  si résultat du 2ème frottis négatif, faire un 3ème prélèvement par une culture de selle à J 14
- 

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques.

Lors des soins à domicile ou de soins ambulatoires chez un patient présentant des diarrhées: port d'une blouse de protection pour les soins avec un **contact direct au**

patient

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

Utiliser le détergent/désinfectant usuel

---

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  A domicile, en présence de diarrhées: désinfection quotidienne des sanitaires avec de l'eau de javel 0.5% (du commerce)
  -  Lors de la levée des mesures ou au départ du patient:
    -  Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
    -  Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
    -  Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement
- 

## Déchets

## Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Déclaration des nouveaux cas à l'Unité cantonale HPCI

---

## Autre information

VD

Flyers/plaquette d'information destinée au patient porteur de BMR

---