

# Méningite à Entérovirus



Mise à jour  
26/05/2025

## Autres dénominations

Enterovirus Du Système Nerveux Central

Informations relatives à  
CMS et soignants indépendants

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Enterovirus (Coxsackie, Echovirus, autres enterovirus non-poliovirus )

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Par contact direct ou éventuellement par gouttelettes lors de contact rapproché

---

## Période d'incubation

3 à 6 jours, plus long chez les nouveau-nés

---

## Durée d'infectiosité

L'excrétion virale peut durer plusieurs semaines après le début de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions Standard est suffisante
  -  Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en Pédiatrie
- 

## Transport

-  Si Mesures Additionnelles CONTACT
    -  Literie et chemise du patient propres
    -  Désinfection du lit
    -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
    -  Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

# Transfert/Sortie



## Si Mesures Additionnelles Contact :



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
  -  Si Mesures Additionnelles:
    -  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
    -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
    -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

### Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
-  Si Mesures Additionnelles. Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
  -  Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
  -  Tout le matériel désinfectable présent en chambre est désinfecté ou retraité
  -  Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
-  Si paravent: nettoyage au quotidien

 Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---