

# Méningite à Entérovirus

Mise à jour  
26/05/2025Autres dénominations  
Méningite Virale

Enterovirus Du Système Nerveux Central

Informations relatives à  
Ambulances et transporteurs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Enterovirus (Coxsackie, Echovirus, autres enterovirus non-poliovirus )

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Par contact direct ou éventuellement par gouttelettes lors de contact rapproché

## Période d'incubation

3 à 6 jours, plus long chez les nouveau-nés

---

## Durée d'infectiosité

L'excrétion virale peut durer plusieurs semaines après le début de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante



Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en Pédiatrie

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle



Si Mesures Additionnelles:



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique (UU)



Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---