

# Méningite à Entérovirus



Mise à jour  
26/05/2025

## Autres dénominations

Enterovirus Du Système Nerveux Central

## Informations relatives à

Cabinets et polycliniques / Médical

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Enterovirus (Coxsackie, Echovirus, autres enterovirus non-poliovirus )

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Par contact direct ou éventuellement par gouttelettes lors de contact rapproché

---

## Période d'incubation

3 à 6 jours, plus long chez les nouveau-nés

---

## Durée d'infectiosité

L'excrétion virale peut durer plusieurs semaines après le début de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions Standard est suffisante
  -  Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en Pédiatrie
- 

## Transport

-  Si Mesures Additionnelles CONTACT
    -  Literie et chemise du patient propres
    -  Désinfection du lit
    -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
    -  Limiter les déplacements aux besoins essentiels
-

## Transfert/Sortie



**Si Mesures Additionnelles Contact :**



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Nettoyage et désinfection

# Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---