

# Méningite à Entérovirus

Mise à jour  
13/11/2024Autres dénominations  
Méningite Virale

Enterovirus Du Système Nerveux Central

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Enterovirus (Coxsackie, Echovirus, autres enterovirus non-poliovirus )

## Réservoir

Homme

## Mode de transmission

Par contact direct ou éventuellement par gouttelettes lors de contact rapproché

## Période d'incubation

3 à 6 jours, plus long chez les nouveau-nés

---

## Durée d'infectiosité

L'excrétion virale peut durer plusieurs semaines après le début de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante



Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en Pédiatrie

---

## Transport



Si Mesures Additionnelles CONTACT



Literie et chemise du patient propres



Désinfection du lit



Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates



Limiter les déplacements aux besoins essentiels

---

## Transfert/Sortie



### Si Mesures Additionnelles Contact :



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---