

# Epiglottite


 Mise à jour  
 08/11/2024

 Autres dénominations  
 Haemophilus Influenzae

 Informations relatives à  
 Cabinets et polycliniques / Médical

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Haemophilus influenzae type b*


---

## Réservoir

 Homme
 

---

## Mode de transmission



transmission par des particules de grosse dimension (&gt; 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.



ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source



les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)

---

## Période d'incubation

Probablement 2 à 4 jours

---

## Durée d'infectiosité

24 heures après le début d'une antibiothérapie efficace

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles GOUTTELETTES pour les cas confirmés par un médecin ORL

---

## Placement



Mise à l'écart du patient dans l'attente de la consultation



Si passage en salle d'attente:



faire porter un masque au patient



Ces mesures peuvent être levées 24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Durée des mesures

Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace

---

## Matériel de soins

-  Réserve au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique
- 

## Transport

-  Port d'un masque de soins par le patient
  -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

-  Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient ceci durant les 24 premières heures du traitement antibiotique adéquat
  -  Pas nécessaire si simple passage dans la salle de consultation
- 

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans les 24h après confirmation du laboratoire

---