

Epiglottite



Mise à jour

08/11/2024

Autres dénominations

Haemophilus Influenzae

Informations relatives à

Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

Epidémiologie

Agent infectieux

Haemophilus influenzae type b

Réservoir

Homme

Mode de transmission



transmission par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.



ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source



les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)

Période d'incubation

Probablement 2 à 4 jours

Durée d'infectiosité

24 heures après le début d'une antibiothérapie efficace

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles GOUTTELETTES pour les cas confirmés par un médecin ORL

Placement



Mise à l'écart du patient dans l'attente de la consultation



Si passage en salle d'attente:



faire porter un masque au patient



Ces mesures peuvent être levées 24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat

Durée des mesures

Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace

Matériel de soins

- Réserve au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - Privilégier le matériel à usage unique
-

Transport

- Port d'un masque de soins par le patient
 - Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
-

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

- Non indiqués en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

-  Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient ceci durant les 24 premières heures du traitement antibiotique adéquat
-  Pas nécessaire si simple passage dans la salle de consultation

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans les 24h après confirmation du laboratoire
