

# Epiglottite



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations  
Haemophilus Influenzae

Informations relatives à  
CHUV / Psychiatrie

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Haemophilus influenzae type b*

---

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission

- transmission par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.
- ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source
- les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur

- portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)
- 

## Période d'incubation

Probablement 2 à 4 jours

---

## Durée d'infectiosité

24 heures après le début d'une antibiothérapie efficace

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Mesures Additionnelles Gouttelettes
- 

## Placement

- Chambre individuelle ou isolement géographique
  - Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)
- 

## Durée des mesures



Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace

---

## Suivi microbiologique



Pas nécessaire de faire un prélèvement de suivi sauf avis contraire HPCI

---

## Soins de base



En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

---

## Matériel de soins



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport



Port d'un masque de soins par le patient et le transporteur



Vêtements propres



Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates



Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie

---

## Circulation



- Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.  
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties à l'extérieur
  - Masque de soins pour le patient et le soignant
  - Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
  - Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient
- 

## Visiteurs



- Port d'un masque de soins
  - Ne pas s'asseoir sur le lit
  - Désinfection des mains en sortant de la chambre
  - Surblouse seulement si participation aux soins
- 

## Transfert/Sortie



- Avertir le service/l'établissement de soins de destination
-

## Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCI-CHUV

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

### Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

### Blouse de protection

- Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
  - Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
-

## Masque de soins

- Oui, masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient
- 

## Lunettes de protection

- Non en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- A la levée des Mesures Additionnelles :**
- Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
  - Conserver le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la chambre sauf si souillures visibles
- 

## Lit et literie

- Utiliser les sacs à linge usuels
- Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

#### **A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Changer le lit et la literie
- 

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

#### **A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
  - Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
  - Pas de changement du rideau de lit
  - Nettoyage de la surface du paravent
  - Pas de trempage du rideau de la salle de bains
- 

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI



Oui

---

## Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans les 24h après confirmation du laboratoire

---