

# Faux-croup



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations  
Parainfluenza Virus

Informations relatives à  
Ambulances et transporteurs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus Parainfluenza et autres virus

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



transmission par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie, etc.



ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres autour de la source



les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge, yeux)

---

## Période d'incubation

1 à 3 jours

---

## Durée d'infectiosité

Pendant toute la durée des symptômes

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures additionnelles GOUTTELETTES

---

## Placement



Mise à l'écart dans l'attente de la consultation



Si passage en salle d'attente :



faire porter un masque au patient

---

## Durée des mesures

Jusqu'à guérison clinique

---

## Matériel de soins

-  Réserve au patient pendant la durée de la maladie
  -  Privilégier le matériel à usage unique.
  -  Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
- 

## Transport

-  Port d'un masque de soins par le patient
-  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

-  Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient
  -  Pas nécessaire si simple passage dans la chambre ou en salle de consultation
- 

## Mesures complémentaires

Si procédure générant des aérosols (intubation/extubation, trachéotomie, bronchoscopie, VNI/Optiflow, laryngoscopie, expectoration induite) le port du masque FFP 2 et de lunettes de protection est recommandé

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---