

# Fièvre hémorragique virale



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations

Ebola

Lassa

Marburg

Crimée-Congo

Informations relatives à  
CHUV / Dialyse

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus

---

## Réservoir

-  Arenavirus: rongeurs (fièvre de Lassa)
  -  Bunyavirus: tiques, bovins, moutons, porcs, oiseaux (Congo-Crimée)
  -  Filovirus: probablement les chauves-souris (Ebola, Marburg)
- 

## Mode de transmission

-  par contact direct entre patients
  -  par l'intermédiaire du personnel (mains)
  -  par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
  -  par gouttelettes
  -  une transmission par aérosol n'est pas exclue
  -  matériel infectieux: tout liquide biologique (sang, salive, urine, sécrétions respiratoires, etc.)
- 

## Période d'incubation

Varie selon le micro-organisme:

-  fièvre de Lassa: 6 à 21 jours
  -  fièvre de Crimée-Congo: 1 à 13 jours
  -  fièvre Ebola: 2 à 21 jours, le plus souvent entre 5 et 12 jours
  -  fièvre de Marburg: 5 à 14 jours
- 

## Durée d'infectiosité

Tant que le virus est présent dans le sang et les sécrétions

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions + Mesures Additionnelles

#### MESURES EXCEPTIONNELLES

Voir procédure spécifique Fièvres hémorragiques virales sous **Tribu, Soins et Médecine, Hygiène Prévention et Contrôle de l'infection**

**Pour la psychiatrie et le CUTR Sylvana**



Patient avec suspicion de FHV (suspicion confirmée par infectiologue), transfert au CHUV pour investigation

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI



Oui, dans l'heure

---

### Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin par téléphone dans les 2 heures

---