

Fièvre hémorragique virale



Mise à jour
08/11/2024

Autres dénominations

Ebola

Lassa

Marburg

Crimée-Congo

Informations relatives à
CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus

Réservoir

-  Arenavirus: rongeurs (fièvre de Lassa)
 -  Bunyavirus: tiques, bovins, moutons, porcs, oiseaux (Congo-Crimée)
 -  Filovirus: probablement les chauves-souris (Ebola, Marburg)
-

Mode de transmission

-  par contact direct entre patients
 -  par l'intermédiaire du personnel (mains)
 -  par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
 -  par gouttelettes
 -  une transmission par aérosol n'est pas exclue
 -  matériel infectieux: tout liquide biologique (sang, salive, urine, sécrétions respiratoires, etc.)
-

Période d'incubation

Varie selon le micro-organisme:

-  fièvre de Lassa: 6 à 21 jours
 -  fièvre de Crimée-Congo: 1 à 13 jours
 -  fièvre Ebola: 2 à 21 jours, le plus souvent entre 5 et 12 jours
 -  fièvre de Marburg: 5 à 14 jours
-

Durée d'infectiosité

Tant que le virus est présent dans le sang et les sécrétions

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions + Mesures Additionnelles

MESURES EXCEPTIONNELLES

Voir procédure spécifique Fièvres hémorragiques virales sous **Tribu, Soins et Médecine, Hygiène Prévention et Contrôle de l'infection**

Pour la psychiatrie et le CUTR Sylvana



Patient avec suspicion de FHV (suspicion confirmée par infectiologue), transfert au CHUV pour investigation

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI



Oui, dans l'heure

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin par téléphone dans les 2 heures
