

Fièvre récurrente



Mise à jour

22/11/2024

Autres dénominations

Borrelia Recurrentis

Informations relatives à
CMS et soignants indépendants

Epidémiologie

Agent infectieux

Borrelia recurrentis, autres borrelies

Réservoir



fièvre récurrente transmise par les poux: homme



fièvre récurrente transmise par les tiques: tiques et mammifères

Mode de transmission



les poux infectés transmettent *Borrelia recurrentis* lorsqu'ils sont écrasés,
contaminant ainsi de petites plaies cutanées



par morsure de tiques

Période d'incubation

5 à 15 jours, le plus souvent 8 jours

Durée d'infectiosité

Les poux vivent 20 à 30 jours, les tiques plusieurs années. Les deux vecteurs peuvent abriter l'agent infectieux toute leur vie

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Autre



Les vêtements et effets personnels du patient doivent subir un traitement approprié contre les poux



Pédiculose du cuir chevelu



lavage à 60° des bonnets, foulards, taies d'oreiller, linge de lit, vêtements, peluches et doudous



mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement



désinfection des peignes et brosses à cheveux avec un shampoing pédiculicide



Pédiculose du corps et pubienne



lavage à 60° des vêtements, sous-vêtements, linge de lit



mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles
