

# Fièvre récurrente



Mise à jour  
22/11/2024

Autres dénominations  
Borrelia Recurrentis

Informations relatives à  
CHUV / Toutes spécialités

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Borrelia recurrentis*, autres borreliases

### Réservoir



fièvre récurrente transmise par les poux: homme



fièvre récurrente transmise par les tiques: tiques et mammifères

### Mode de transmission



les poux infectés transmettent *Borrelia recurrentis* lorsqu'ils sont écrasés, contaminant ainsi de petites plaies cutanées



par morsure de tiques

---

## Période d'incubation

5 à 15 jours, le plus souvent 8 jours

---

## Durée d'infectiosité

Les poux vivent 20 à 30 jours, les tiques plusieurs années. Les deux vecteurs peuvent abriter l'agent infectieux toute leur vie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Autre



En cas de poux, se référer à la fiche microorganisme : Pédiculose

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

## Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
- 

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
  - Lors de symptômes respiratoires
- 

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

### Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---