

# Fièvre récurrente

Mise à jour  
22/11/2024Autres dénominations  
*Borrelia Recurrentis*Informations relatives à  
CHUV / Stérilisation

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Borrelia recurrentis*, autres borrelies

## Réservoir



fièvre récurrente transmise par les poux: homme



fièvre récurrente transmise par les tiques: tiques et mammifères

## Mode de transmission

les poux infectés transmettent *Borrelia recurrentis* lorsqu'ils sont écrasés,  
contaminant ainsi de petites plaies cutanées



par morsure de tiques

---

## Période d'incubation

5 à 15 jours, le plus souvent 8 jours

---

## Durée d'infectiosité

Les poux vivent 20 à 30 jours, les tiques plusieurs années. Les deux vecteurs peuvent abriter l'agent infectieux toute leur vie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Autre



En cas de poux, se référer à la fiche microorganisme : Pédiculose

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---