HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Fièvre récurrente

PS

Mise à jour
28/10/2026

Autres dénominations
Borrelia Recurrentis

Informations relatives à
CHUV / Psychiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Borrelia recurrentis,* autres borrelies

Réservoir

- Fièvre récurrente transmise par les poux: homme
- Fièvre récurrente transmise par les tiques: tiques et mammifères

Mode de transmission

- Les poux infectés transmettent *Borrelia recurrentis* lorsqu'ils sont écrasés, contaminant ainsi de petites plaies cutanées

Par morsure de tiques

Période d'incubation

5 à 15 jours, le plus souvent 8 jours

Durée d'infectiosité

Les poux vivent 20 à 30 jours, les tiques plusieurs années. Les deux vecteurs peuvent abriter l'agent infectieux toute leur vie

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Autre

En cas de poux, se référer à la fiche microorganisme : Pédiculose

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles