

# Fièvre thyphoïde et parathyphoïde

PS

Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations  
Salmonella

Informations relatives à  
EMS, EPSM, ESE, CAT

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Salmonella Typhi* (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar *Typhi*) ou *Salmonella Paratyphi* A, B, ou C

---

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission



dans la communauté: par consommation d'aliments ou d'eau contaminée

- à l'hôpital: par des objets ou du matériel souillés par des selles ou de l'urine
- 

## Période d'incubation

- Typhi: 3 à 60 jours, le plus souvent entre 8 et 14 jours
- Paratyphi: 1 à 10 jours
- 

## Durée d'infectiosité

Tant que l'agent infectieux est présent dans les selles (quelques jours à plusieurs semaines)

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante, sauf si incontinence

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

- **Si Précautions Standard:**
    - Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
  - **Si Mesures Additionnelles Contact:**
    - Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
    - Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
- 

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Autres

Le personnel de cuisine atteint de fièvre typhoïde doit être exclu du travail pendant la phase aiguë de la maladie et jusqu'à obtention de 3 coprocultures négatives

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  - Vaisselle : filière habituelle
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Si Mesures Additionnelles Contact:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

### Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration à HPCi Vaud

Oui si Mesures Additionnelles Contact

---

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin en moins de 24 heures.

---