

# Fièvre typhoïde et paratyphoïde

Mise à jour  
08/11/2024Autres dénominations  
Salmonella

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Bloc opératoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Salmonella Typhi* (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Typhi) ou *Salmonella Paratyphi*  
A, B, ou C

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



dans la communauté: par consommation d'aliments ou d'eau contaminée



à l'hôpital: par des objets ou du matériel souillés par des selles ou de l'urine

---

## Période d'incubation

Typhi: 3 à 60 jours, le plus souvent entre 8 et 14 jours

Paratyphi: 1 à 10 jours

---

## Durée d'infectiosité

Tant que l'agent infectieux est présent dans les selles (quelques jours à plusieurs semaines)

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante



Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en présence de facteurs de risque de dissémination (avec incontinence fécale ou non compliant aux mesures d'hygiène de base)

---

## Placement

Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT

---

# Signalétique

## Si Mesures Additionnelles Contact:

- > Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
  - > Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
  - > Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
  - > Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
- 

# Matériel de soin

## Si Mesures Additionnelles Contact:

- > Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  - > Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  - > Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

# Transport

## Si Mesures Additionnelles Contact:

- > Literie et chemise du patient propres
- > Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- > Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- > Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles



Désinfection du lit

---

## Transfert/Sortie

### **Si Mesures Additionnelles Contact :**



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection



#### **Si Précautions Standard:**



Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques



#### **Si Mesures Additionnelles Contact:**



Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat



Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Autres

Le personnel de cuisine atteint de fièvre typhoïde doit être exclu du travail pendant la phase aiguë de la maladie et jusqu'à obtention de 3 coprocultures négatives

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Si Mesures Additionnelles Contact:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Si Mesures Additionnelles Contact:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
      - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
      - Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
      - Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration à HPCi Vaud

Oui si Mesures Additionnelles Contact

---

## Déclaration au service HPCI

Oui, si Mesures Additionnelles

---

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin en moins de 24 heures.

---