

# Fièvre thyphoïde et parathyphoïde



Mise à jour  
08/11/2024

Autres dénominations  
Salmonella

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Salmonella Typhi* (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar *Typhi*) ou *Salmonella Paratyphi* A, B, ou C

---

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission



dans la communauté: par consommation d'aliments ou d'eau contaminée

- à l'hôpital: par des objets ou du matériel souillés par des selles ou de l'urine
- 

## Période d'incubation

- Typhi: 3 à 60 jours, le plus souvent entre 8 et 14 jours
  - Paratyphi: 1 à 10 jours
- 

## Durée d'infectiosité

Tant que l'agent infectieux est présent dans les selles (quelques jours à plusieurs semaines)

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante
  - Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT en présence de facteurs de risque de dissémination (avec incontinence fécale ou non compliant aux mesures d'hygiène de base)
- 

## Placement

Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT

---

# Signalétique

## **Si Mesures Additionnelles Contact:**

- Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
  - Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
  - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
  - Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
- 

# Matériel de soin

## **Si Mesures Additionnelles Contact:**

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  - Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  - Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

# Transport

## **Si Mesures Additionnelles Contact:**

- Literie et chemise du patient propres
- Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles



Désinfection du lit

---

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection



**Si Précautions Standard:**



Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques



**Si Mesures Additionnelles Contact:**

-  Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
  -  Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
- 

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Autres

Le personnel de cuisine atteint de fièvre typhoïde doit être exclu du travail pendant la phase aiguë de la maladie et jusqu'à obtention de 3 coprocultures négatives

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
-

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Si Mesures Additionnelles Contact:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Si Mesures Additionnelles Contact:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
      - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
      - Idéalement, changement de rideau de séparation à la sortie du patient
      - Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

## Déclaration du cas

## Déclaration à HPCi Vaud

Oui si Mesures Additionnelles Contact

---

## Déclaration au service HPCI

Oui, si Mesures Additionnelles

---

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin en moins de 24 heures.

---